quadrans, et pro potu dimidia vini menſura aqua diluti.

Die 5ta. Hora 2da nocturna ingruit febris cum horripilatione, quam poſt dimidiam horam ſubſequitur calor vehemens, cephalalgia, ſitis, et tandem ſudor largus. Mane reperimus aegrum laſſum, pulſum debilem et parvum, adpetitum proſtratum, alvum clauſam. Medicamina et Diaeta eadem.

Die 6ta. Aeger ſat bene ſe habet: adpetit, alvumque bis depoſuit. Repet. pulveres. Diaeta eadem.

Die 7ma. Hora 3tia nocturna rediit febris: aſt calor et cephalaea mitior; ſitis multa; ſudor pene nullus. Poſt unius horae ſpatium ſomnus revertitur. Mane queritur aeger de oris amaritie et praecordiorum preſſione. Alvus clauſa. Facies pallida, caput vertiginoſum, lingua muco albeſcente obducta, reſpiratio libera, pulſus parvus ac debilis, ſumma virium proſtratio. Medicamina et Diaeta eadem.

Die 8va. Aeger non queritur niſi de corporis debilitate, et adpetit. Alvi et urinae excretio naturalis. Medicamina et Diaeta eadem.

Die 9na. Nocte dormivit aeger, nec niſi hora 6ta matutina correptus levi horripilatione, quam ſequebantur calor et ſitis exigua. Sed mox disparent et haec ſymptomata, horaque 9na aegrum febri omnino liberum vidimus. Adpetit cibos. Alvus mota. Repetuntur pulveres. Diaeta eadem.

Dio 10ma. Apyrexia. Aeger bene dormivit, et adpetit. Repetuntur pulveres. Diaeta eadem.

Die 11ma. Bene dormivit. Hora 8va ingruit horripilatio corporis univerſi, quam poſt dimidiam horam ſequitur cephalaea, calor, denique ſudor, ſiletque poſt unius horae ſpatium paroxyſmus febrilis. Ordinatur:

℞. Pulv. cort. peruv. Scrup. duos.

UNIVERSITÄTS BIBLIOTHEK HEIDELBERG
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/annales_instituti_medico_clinici_wirceburgensis1799/030
© Universitätsbibliothek Heidelberg
gefördert durch die DFG