Si vero retardantur aut aequaliter stant nec procedunt aliquo
sensibili evacuatione copiosa, nunc grossitudinem et longi- 76
tudinem morbi significat: quare si cum his multis fuerit
defecta et apparuerit, pestis mortem expectabis. Item si
paroxismi anticipant: est augmentum. Si postponantur
et evacuatio sensibilis transeat copiosa, est declinatio.
Si vero aequaliter permanent, et signa digestionis perfectae non
apparuerint, et accidentia malignantis statum maxime
dubitabis. Et idem intelligendum est in tertiana interpol-
lata similiter et quartana. Verum et in exacerbationibus
febrium continuarum proportionalium idem indicandum. Item
haec febris si multum perduraverit, procedunt ad febrem ethi-
cam dispositione humorum supposita. Sed etiam ad ydro-
pisim vel sui dispositionem ducunt, similiter et du-
cit ad febres erraticas, et demum ad quartanam. Unde Ypo-
[illegible] pro: febribus inordinatis vagantibus quartanae fiunt fe-
bres. Item si patiens ex ea somnolentus fuerit cum hora
et gravitatem senserit circa caput subito aut stuporem [illegible]
dicat futurum, nisi cum medicinis evacuantibus per in-
ferius vehementer stimuletur et cerebrum ex rebus cali-
dis fortiter excitetur: ut fertur per doctrinam lib. primo.

De febre flegmatica continua, quae latica nuncupatur.

Ex Bertrucio Bononiensi.

Haec febris est proportionabilis febri flegmaticae interpollatae:
quia fit ex flegmate non interpollato et humoribus crudis fri-
gidis intra venas putrescentibus. Singulis exacerbatur
quotidie: et proprie apud occasum solis, quemadmodum
et febris illa: verum quia modica est eius caliditas respec-
tu febrium continuarum, ideo latica nominatur. Signa eius
sunt signa febris flegmaticae interpollatae. Tamen [illegible]
pilatio non est cum ea periodica: quemadmodum nec in
aliis febribus quibuscunque continuis, sed est nobis similitudo