

## SCHÖNE KLETTERVÖGEL

### Fig. 1. Der furchenschnabelige Aracari.

(*Pteroglossus sulcatus*.)

Dieser ganze Vogel ist sammt dem drei Zoll betragenden Schnabel zwölf Zoll lang; der Schnabel ist oben gewölbt und roth, an der Seite zusammengedrückt, schwarz, und hat auf jeder Seite zwei Furchen. Das Gefieder ist oben Papageygrün, unten blasgrün. Es ist dieser Vogel nur erst in zwei Exemplaren aus dem spanischen America nach Europa gebracht und seiner Lebensart nach nicht bekannt, die wahrscheinlich mit der Pfefferfrasse (*Rhamphastos*) Aehnlichkeit haben wird.

### Die Pogonias.

Die Pogonias sind Vögel, welche den Bartvögeln sehr nahe stehen. Die Fig. 2 — 5 abgebildeten Arten sind in Afrika zu Hause.

### Fig. 2. Der furchenschnabelige Pogonias

(*Pogonias sulcirostris*.)

Ist oben blauschwarz, die Flügel sind braun, Kehle, Obertheil der Brust und Unterleib scharlachroth, und auf dem Rücken steht ein

weißer Fleck. Der Oberschnabel hat eine starke Längenfurche.

### Fig. 3. Der glattschnabelige Pogonias

(*Pogonias laevirostris*.)

unterscheidet sich von dem vorigen nur durch seinen glatten Schnabel, und durch scharlachrothe Flecken auf dem Scheitel und einer merklichen scharlachrothen Binde über die Flügel.

### Fig. 4. Vieillot's Pogonias.

(*Pogonias Vieilloti*.)

Das Gefieder ist an der Hauptfarbe braun, unten weißlich. Der Ober- und Vordertheil des Körpers mit scharlachrothen Flecken besetzt. Die mittlern Schwungfedern mit blasen Rändern.

### Fig. 5. Stephens's Pogonias.

(*Pogonias Stephensii*.)

Schwarz von Farbe mit rothem Scheitel über den Augen und auf dem Rücken mit gelben Fleckenstreifen, an der Seite des Halses weiße Flecken. Der Unterleib weiß.