

49. Erymna, N., bei Ormana nordwestlich von Kotenna, an einem rechten Nebenfluss des Melas gefunden von Hirschfeld, 1875, S. 142.

Hinzu kommen:

50. Amblada, HN. (Lykaonia), AM. (ZFN., 1885, S. 72; 1890, S. 12); wegen zahlreicher in Gundani (siehe zu 16) Eingeschriebener aus Amblada (Ἀμπλάδα) von Ramsay, JHS., 1883, S. 37 in dessen Nähe vermuthet.
51. Μίτρον, siehe zu 6.
52. Agrai, N. (X 490, XIII 340 setzt zu Seleukeia ἤτοι Ἀγρών), von Hirschfeld, 1879, S. 315 in Aghras erkannt. Vergl. Sterret, WE. 468.
53. Κονάνη, N. (Pisid.), P. (Phryg. Pisid.), M., von Hirschfeld, 1879, S. 315 in Günen erkannt; durch Inschriften von Duchesne und Collignon, BCH., 1879, S. 333 und Sterret, WE. 337, 474 bestätigt.
54. Minass(os), M. Eine Homonoiamünze Μινασσέων καὶ Κονανέων ist bei Head, HN., S. 590 beschrieben. Sterret, WE., S. 332 fand die Reste von Minassos eine Stunde östlich von Isbarta bei Minassun.
55. Prostanta, P. (Pamph. Pisid.), M., nach Ramsay, HG., S. 406 = Themisonion 13* = Ejerdir.
- 56–60. (?) Ptolemaeus nennt ausserdem (Pamph. Pisid.) Orbanassa, Talbonda (jenes nach Ramsay, HG., S. 406 = 54, dieses nach S. 402 = 8), Οὐζέλα (Phryg. Pisid.), Πιλάνη Βουδοε (Liv. 38, 15); Strabo, 12, S. 570 Sandalion.