

— 131 —

ceolatis acutis demum discoideo-conniventibus, alis e medio dorso ortis transverse latioribus imbricatis albidis.

Species *S. carinatae* C. A. Mey. et inprimis *S. spissae* M. B. affinis, a quibus differt indumento, perigonii laciniis magis elongatis, alis albidis nec rufescentibus. Ab omnibus *S. vermiculatae* L. formis duratione annua praeter notas anatomicas et florales longe differt, multo magis etiam a *S. inermi* Forsk., quae indumento duplici aliena.

913. *Noaea mucronata* (Forsk.) Aschers. et Schweinf. Syn. *N. spinosissima* Moq. Tand. Boiss. IV. 965. arab. : *chók-el-hanach* (Forsk.), '*athirr, thirr, dirr* (Schweinf.)  
M. ma., p. D. i., a. sept.
914. *Anabasis articulata* (Forsk.) Moq. Tand. Boiss. IV. 970. (excl. pl. Boveana cf. sub n° 903). arab. : *tartir* (Forsk.), '*agueram, 'adjeram* (Ehrenb., Schweinf.), *belbel* (Aschers.)  
M. ma., p. O. D. l., i., a. sept.
915. *A. setifera* Moq. Tand. Boiss. IV. 970. arab. : *hamd, guil-lou* (Schweinf.)  
D. a. sept.
916. *Cornulaca monacantha* Del. Boiss. IV. 984. arab. : *hâd.*  
O. D. l., i., a. sept., a. mer.
917. *Agathophora alopecuroides* (Del.) Bunge. Syn. Halogeton a. Moq. Tand. Boiss. IV. 985. arab. : *hamd, damrân, cha'arân* (Schweinf.)  
D. l., a. sept.

### Basellaceae.

*Boussingaultia baselloides* Kth.

cult. le long des murs et dans les jardins des villes.

*Anredera scandens* (L.) Moq. Tand. arab. : *masâs.*

cult. dans les jardins d'Alexandrie (Acerbi) et du Caire (Sieber); nous ignorons si cette plante existe encore à présent.

17\*