

L'oie des moissons habite les régions occidentales de la zone paléarctique. Elle hiverne dans toute l'Europe méridionale ainsi que dans le nord de l'Afrique.

Anser sylvestris est de passage régulier dans l'Europe centrale entre le milieu d'octobre et le milieu de décembre. De la fin de février au commencement de mars, elle regagne le nord de la Russie et la Laponie, où elle niche vers le milieu de mai.

Branta ruficollis, PALLAS.

Anser ruficollis, PALLAS, Spicill. zool., fasc. VI, p. 21, t. IV (1769).

Bernicla ruficollis, GOULD, Birds of Europe, pl. 351 (1837).

Branta ruficollis, SALVADORI, Catal. Brit. Mus., vol. XXVII, p. 124 (1895).

Les bernaches du panneau de Meidoum appartiennent sans le moindre doute à *Branta ruficollis* qu'on ne peut confondre ni avec la bernache commune, *Branta bernicla*, signalée par SHELLEY dans la faune actuelle de l'Égypte (Birds of Egypt, p. 281), ni avec *Branta leucopsis*. Ces dernières espèces ne portent en effet aucune trace des larges taches marron qui se voient en arrière de l'œil et sur la gorge de *Branta ruficollis*.

La bernache à cou roux est un petit anséridé de la taille environ de l'oie à front blanc. Comme dans toutes les espèces du genre *Branta*, la tête est grosse, la bec court, large et haut vers la base, aminci à la pointe. Chez *Branta ruficollis*, le plumage du mâle et de la femelle adultes est noir sur la tête et derrière le cou. Le noir de la couronne se prolonge en une bande qui coupe transversalement, au niveau de l'œil, les faces latérales de la tête. La gorge et la face antérieure du cou sont de couleur rouge cannelle ainsi qu'une tache qui s'étend sur les côtés de la tête, en arrière de l'œil. Les autres parties du cou et de la tête sont blanches.

Dos brun noirâtre, croupion et sus-caudales blanchâtres. Queue arrondie, noire. Ailes brun noirâtre atteignant à peu près l'extrémité de la queue. Poitrine noire ou brun foncé. Ventre et sous-caudales blancs. Flanes blancs avec bandes noires. Quelques plumes pâles des couvertures grandes et moyennes, forment deux bandes grisâtres sur les ailes. Bec presque noir. Iris jaunâtre. Pieds brun foncé presque noirs. Longueur du tarse 0^m053 millimètres.

La femelle est un peu plus petite que le mâle. Chez les jeunes on voit des plumes brun foncé à la place des plumes noires; les taches rouge cannelle apparaissent progressivement avec l'âge.

Suivant SALVADORI, *Branta ruficollis* niche dans les vallées de l'Obi et du Yénisséi. Elle hiverne dans l'ouest de la Sibérie, le nord du Turkestan et sur les bords de la mer Caspienne; accidentellement elle se montre en Europe ainsi qu'en Égypte.

Pour conclure, nous nous bornerons à constater que, des quatre espèces d'oies figurées sur le panneau de Meidoum, une seule, *Anser albifrons*, est commune actuellement en Égypte. Les trois autres sont très rares ou ne se montrent plus dans la vallée du Nil. Cette constatation prouve le grand intérêt qui s'attache à l'étude des figurations anciennes. Identifiées avec soin, ces représentations animales ne doivent pas seulement fournir une importante contribution à l'histoire de la pharaonique, elles peuvent aussi nous donner des indications précises sur les changements survenus au cours des siècles, dans l'habitat ou les migrations de certaines espèces.

Lyon, 28 juillet 1905.